

Contraceção Hormonal Injectável

Acetato de Medroxiprogesterona/ Enantato de Noretisterona*

Condições médicas em que os Contraceptivos Hormonais Injectáveis **NÃO** se encontram recomendados.

Categoria 3 – Riscos teóricos ou provados prevalecem sobre as vantagens do uso do método.

Categoria 4 – risco inaceitável para a saúde se o método for usado.

| | |
|--|-------|
| Amamentação | |
| • <6 Semanas pós-parto | 3 |
| Doença Cardiovascular | |
| • Múltiplos factores de risco (idade avançada, tabagismo, diabetes, HTA, obesidade e dislipidemia) | 3 |
| • Cardiopatia isquémica (aguda ou antecedentes) | 3 |
| • Antecedentes de AVC | 3 |
| Hipertensão | |
| • TA elevada i) ≥ 160 mmHg (sistólica) ou ≥ 100 mmHg (diastólica) | 3 |
| • Doença Vascular | 3 |
| Diabetes | |
| • Nefropatia/Retinopatia/Neuropatia | 3 |
| • Outra doença vascular ou diabetes com <20 anos de duração | 3 |
| Trombose Venosa Profunda (TVP) / Embolia Pulmonar (EP) | |
| • TVP/EP agudo | 3 |
| Lúpus Eritematoso Sistémico | |
| • Anticorpos anti-fosfolípidos positivos (ou desconhecidos) | 3 |
| • Trombocitopenia grave | 3 (I) |

(I) – INICIAÇÃO: Quando a condição se desenvolve no momento em que inicia o método

(C) – CONTINUAÇÃO: Quando a condição se desenvolve durante a utilização do método

* Contraceção Hormonal Injectável com Enantato de Noretisterona não se encontra disponível em Portugal.

Adaptado de "Medical eligibility criteria for contraceptive use - 5th ed. World Health Organization, 2015"



Contraceção Hormonal Injectável

Acetato de Medroxiprogesterona/ Enantato de Noretisterona*

| Doença Gastrointestinal | |
|---|-------|
| • Cirrose: grave (descompensada) | 3 |
| • Tumores hepáticos | |
| i) Benignos (adenoma hepatocelular) | 3 |
| ii) Malignos (hepatoma) | 3 |
| Cefaleias | |
| • Enxaqueca com aura | 3 (C) |
| Cancro da Mama | |
| • Actual | 4 |
| • Antecedentes ou sem evidência de doença desde há 5 anos | 3 |
| Hemorragia Vaginal Inexplicada | |
| • Suspeita de condição grave, previamente a avaliação | 3 |

