

Dispositivos Intra-Uterinos

Condições médicas em que os Dispositivos Intra-Uterinos com Cobre (DIU-Cu) e com Levonorgestrel (DIU – LNG) **NÃO** se encontram recomendados.

Categoria 3 – Riscos teóricos ou provados prevalecem sobre as vantagens do uso do método.

Categoria 4 – Risco inaceitável para a saúde se o método for usado.

	DIU - Cu	DIU - LNG
Saúde Materna		
• < Gravidez e pós- imediato de aborto séptico	4	4
• Pós-parto:		
i) > 48h a < 4 Semanas	3	3
ii) Sépsis no puerpério	4	4
Patologia Cardiovascular		
• Cardiopatia isquémica (aguda ou antecedentes)	1*	3 (C)
Trombose Venosa Profunda (TVP) / Embolia Pulmonar (EP)		
• TVP/EP aguda	1*	3
Lúpus Eritematoso Sistémico		
• Anticorpos anti-fosfolípidos positivos (ou desconhecidos)	1*	3
• Trombocitopenia grave	3 (I)	2*
Doença Trofoblástica Gestacional		
• Níveis β -hCG indetectáveis ou decrescentes	3	3
• Níveis β -hCG persistentemente elevados ou doença maligna	4	4
Patologia Ginecológica		
• Miomas uterinos com distorção da cavidade uterina	4	4
• Anomalias anatómicas: cavidade uterina distorcida (qualquer anomalia uterina congénita ou adquirida com distorção da cavidade incompatível com a inserção de DIU)	4	4
• Hemorragia vaginal inexplicada (previamente a avaliação)	4 (I)	4 (I)
• Doença Inflamatória Pélvica: activa	4 (I)	4 (I)
Terapêutica Antirretroviral		
	2*/3 (I)	2*/3 (I)



Dispositivos Intra-Uterinos

	DIU - Cu	DIU - LNG
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST's)		
• Cervicite purulenta activa ou infecção por clamídia ou gonorreia	4 (I)	4 (I)
• Risco aumentado de IST's	2*/3 (I)	2*/3 (I)
• Infecção por VIH – estadio 3 ou 4 da OMS	3 (I)	3 (I)
Patologia Gastrointestinal		
• Cirrose: grave (descompensada)	1*	3
• Tumores hepáticos		
i) Benignos (adenoma hepatocelular)	1*	3
ii) Malignos (hepatoma)	1*	3
Neoplasias Ginecológicas		
• Cancro da Mama:		
i) Actual	1*	4
ii) Antecedentes ou sem evidência de doença desde há 5 anos	1*	3
• Cancro do Colo do Útero (aguardando tratamento)	4 (I)	4 (I)
• Cancro do Endométrio (aguardando tratamento)	4 (I)	4 (I)
• Cancro do Ovário	3 (I)	3 (I)
Cefaleias		
• Enxaqueca com aura (qualquer idade)	1*	3 (C)
Tuberculose Pélvica		
	4 (I)/ 3 (C)	4 (I)/ 3 (C)

(I) – INICIAÇÃO: Quando a condição é desenvolvida no momento em que inicia o método

(C) – CONTINUAÇÃO: Quando a condição se desenvolve durante a utilização do método

★

- 1 – Categoria 1: uso do método sem restrição.
- 2 – Categoria 2: as vantagens do uso do método superam os riscos teóricos ou comprovados.

Adaptado de "Medical eligibility criteria for contraceptive use - 5th ed. World Health Organization, 2015"