GEPeCx
Grupo de Estudos de Pequena Cirurgia

apmgf
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE MEDICINA GERAL E FAMILIAR

Mordeduras: Avaliação e abordagem

Avaliação inicial:
- Aplicar pressão se hemorragia ativa
- Remoção de corpos estranhos
- Irrigação abundante com água ou solução antissética
- Avaliar proximidade ou lesão de estruturas adjacentes (nervosas, vasculares, articulares)
- Sinais de infeção

Profilaxia:
- Vacina e/ou imunoglobulina contra o tétano de acordo com o PNV
- Vacina e/ou imunoglobulina contra a raiva se epidemiologia sugestiva

Ferida infetada?

SIM → **Tratamento antibiótico**

NÃO →

Algum dos seguintes presentes?
- Laceração facial complexa
- Ferida profunda adjacente a estrutura óssea, tendinosa ou outra estrutura major
- Ferida com compromisso neurovascular
- Corpo estranho retido, que não é possível remover através de procedimento minor

SIM → **Profilaxia antibiótica**
Enviar ao Serviço de Urgência

NÃO →

Ferida cosmeticamente significativa na face ou mordedura de cão com ferida aberta no tronco, braço ou perna e TODOS os seguintes?
- Paciente imunocompetente
- Não afeta mão ou pé
- Mordedura recente (<12h se extremidade ou <24h se facial)
- Sem esmagamento ou ferida não punctiforme
- Sem antecedentes de celulite ou compromisso venoso/linfático da extremidade afetada

SIM → **Encerrar ferida com sutura**
Profilaxia antibiótica

NÃO →

Deixar ferida aberta (cicatrização por 2ª intenção)

Algum dos seguintes presente?
- Envolvimento de tecidos profundos (penetração da derme)
- Ferida punctiforme
- Ferida associada a esmagamento
- Ferida na mão, pé, face ou genitais
- Proximidade com osso ou articulação (incluindo prótese articular)
- Localização em área com antecedentes de celulite ou compromisso venoso/linfático
- Imunocomprometidos (incluindo Diabetes Mellitus)
- Ferida sem cuidados durante >8h

SIM → **Profilaxia antibiótica**

NÃO → **Não prescrever antibiótico**

1ª linha	Duração
Amoxicilina/Ácido clavulânico 875/125 mg, 12/12h	Profilaxia: 3-5 dias Infeção: 5-14 dias
Alternativas	
Cefuroxima 500 mg, 12/12h OU Doxiciclina 100 mg, 12/12h + Metronidazol 500 mg , 8/8h OU Clindamicina 300-450 mg, 8/8h	

Autoria:
Catarina Novais e Sara Almeida

Fonte:
Baddour LM et al. Animal bites (dogs, cats, and other mammals): Evaluation and management. In: UpToDate, Connor RF (Ed), Wolters Kluwer. (Consultado em fevereiro 2024)